

BIOENTEROM

Probiotic pentru stabilizarea florei intestinale la porumbei si alte specii

- **NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI**

Romvac Company S.A.

Șoseaua Centurii, nr. 7, Voluntari, Ilfov-077190, România

Telefon: 021 350 3106; 021 350 3107; 021 350 3109

Fax: 021 350 3110; 021 352 7584

- **DENUMIREA PRODUSULUI**

BIOENTEROM - Probiotic pentru stabilizarea florei intestinale.

- **COMPOZIȚIE**

Germeți *Enterococcus faecium tulpina NCIMB11181* minim 1×10^8 UFC/ml în zer deproteinizat, glicerinat.

- **INDICAȚII**

Produsul Bioenterom se administrează:

- cu predilecție în primele zile de viață la speciile țintă, având ca scop colonizarea intestinului, stimularea creșterii unei microflore benefice și inhibarea dezvoltării germenilor patogeni (*E. coli*, *Salmonella*, *Pseudomonas*, *Clostridium* etc.).

Consecutiv acestei colonizări:

- Se stabilizează digestia
- Crește conversia furajelor și absorbția nutrienților
- Crește sporul zilnic în greutate
- Se reduce nivelul toxinelor în intestin
- Este stimulată protecția barierei intestinale

- **SPECII ȚINTĂ**

- Păsări: porumbei, găini, curcani, bibilici, rațe, găște, fazani, canari, papagali.
- Bovine, ovine, caprine, porcine.
- Câini, pisici.

- **MOD DE ADMINISTRARE**

Păsări: indiferent de specie, produsul se va administra

- În primele 3 zile după ecloziune
- Înainte și în timpul perioadelor de stress (vaccinări, transport, lotizări, procese infecțioase)
- După terapia cu antibiotice
- În perioada de finisare, cu scopul reducerii riscului infecțiilor cu germeni patogeni (*Salmonella*, *E. coli*)

Se administrează în apa de băut în cantitate de 1 ml la 1 litru de apă timp de 2 -3 zile.

LA PORUMBEI SE RECOMANDA ADMINISTRAREA DUPA ECLOZIUNE, INDIVIDUAL, ORAL, A CATE 1 PICATURA BIOENTEROM / ZI, 2-3 ZILE (IN CAZUL EFECTIVELOR MICI) SAU IN APA DE BAUT A PARINTILOR.

LA VARSTA DE 12-15 ZILE SI LA INTARCARE SE RECOMANDA O NOUA ADMINISTRARE.

Viței, miei, iezi: se folosește pentru optimizarea înlocuitorilor de lapte (colostru artificial) asigurând o protecție efectivă împotriva germenilor patogeni și prevenind apariția enteritelor postnatale.

Se administrează timp de 2-3 zile în lapte sau colostru artificial în următoarele doze:

- 1 ml la 1 litru lapte în scop colonizării intestinului.
- 2 ml la 1 litru lapte în tulburări digestive ușoare
- 3-4 ml la 1 litru lapte în diaree

Purcei: se administrează 10 ml în 1 litru apă de băut, timp de 2-3 zile, imediat după înțârcare, pentru prevenirea apariției diareilor. În cazul apariției diareei, doza trebuie să fie de 20 ml la 1 litru apă până la dispariția diareei.

Câini și pisici:

- În prima zi de viață se pot administra per os cu pipeta 0,2-0,5 ml/animal.
- După vârsta de 4 săptămâni, în lapte sau pulverizat peste hrana uscată, 1-2 ml per animal, timp de 2-3 zile.
- În cazul apariției enteritelor se pot administra 5 ml/animal/zi, asociat cu medicația specifică.

Agitați energic înainte de utilizare!

• **PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se depozita și transporta în condiții de refrigerare (+2/+8° C).

A nu se congela.

• **VALABILITATE**

8 luni de la data fabricării, respectând cerința de depozitare la +2/+8° C.

• **PREZENTARE**

Aspect: lichid tulbure, de culoare gălbuie cu un sediment care se omogenizează prin agitare.

Recipiente din sticlă sau polipropilenă conținând 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml sau 1000 ml produs.